

Название комплекса	
245.155	Секс в городе - 11 инфекций
217.205	Цитомегаловирус, определение ДНК
217.411	Герпесвирус I и II типа, определение ДНК
218.002	Гонококк (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>), определение ДНК
219.013	Хламидии (<i>Chlamydia trachomatis</i>), определение ДНК
220.007	Papilloma virus (6/11/16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68 типы)
221.007	Микоплазма (<i>Mycoplasma genitalium</i>), определение ДНК
221.019	Микоплазма (<i>Mycoplasma hominis</i>), определение ДНК
221.020	<i>Ureaplasma urealyticum</i> , определение ДНК
221.022	<i>Ureaplasma parvum</i> , определение ДНК
222.001	Гарднерелла (<i>Gardnerella vaginalis</i>), определение ДНК
223.002	Трихомонада (<i>Trichomonas vaginalis</i>), определение ДНК
245.156	Секс в городе - 7 инфекций
218.002	Гонококк (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>), определение ДНК
219.013	Хламидии (<i>Chlamydia trachomatis</i>), определение ДНК
221.007	Микоплазма (<i>Mycoplasma genitalium</i>), определение ДНК
221.019	Микоплазма (<i>Mycoplasma hominis</i>), определение ДНК
221.020	<i>Ureaplasma urealyticum</i> , определение ДНК
221.022	<i>Ureaplasma parvum</i> , определение ДНК
223.002	Трихомонада (<i>Trichomonas vaginalis</i>), определение ДНК

Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП)



ЗППП или БППП (болезни, передаваемые половым путем) – это инфекционные заболевания, передающиеся от человека к человеку преимущественно половым путем. В настоящее время насчитывается более 20 возбудителей болезней (бактерии, вирусы, простейшие, дрожжевые грибы, членистоногие). Вызываемые ими заболевания (сифилис, гонорея, мочеполовой хламидиоз и трихомониаз, кандидозный вульвовагинит,

микоплазмоз, генитальный герпес и др.) характеризуются высокой контагиозностью (заразительностью) и быстрым распространением среди людей, имеющих факторы риска.

По данным ВОЗ, *каждый десятый человек в мире*, включая детей и старииков, болеет тем или иным ЗППП. В 2006 г. в России зарегистрировано 2,0 млн. больных.

Группы риска:

- Молодёжь до 25 лет.
- Пожилые люди старше 50 лет.
- Люди, страдающие наркотической зависимостью.
- Люди, связанные с коммерцией в сфере секса (проституция).
- Врачи, медсёстры, санитары, лаборанты т.е. люди, имеющие «контакт» с кровью.
- Бездомные;
- Гомосексуалисты и другие люди, склонные к сексуальным отклонениям.
- Люди, которым делали переливание крови.
- Близкие и родственники пациентов, страдающих этими заболеваниями.
- Люди, имевшие незащищенные половые контакты.
- Люди, имеющие более одного полового партнера.

Принадлежность к двум и более группам требует пристального внимания к собственному здоровью, периодическому осмотру врачом и профилактическому обследованию.